

FEDERACION NACIONAL

DE

CAFETEROS DE COLOMBIA

GERENCIA TECNICA

DIVISION DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION
CHINCHINA - CALDAS

AVANCES TECNICOS

Cenicafé

ISSN 0180-0178

SEPTIEMBRE 1977 No.

ALGUNAS UNIDADES DE SUELOS DE LA ZONA CAFETERA

Alvaro Gómez-Aristizábal *

Con base en los reconocimientos de los suelos de la zona cafetera realizados por el Programa de Desarrollo y Diversificación; los análisis físicos y químicos de los mismos realizados por Cenicafé y las visitas de los técnicos de suelos a las zonas respectivas, se presente la caracterización de los suelos para el cultivo del café indicando los factores que pueden limitar el cultivo y sus repercusiones en la producción. Con esto se busca orientar al agricultor, a los técnicos, a las agencias de crédito y la Institución misma en sus programas de acción, para tener mayor seguridad de éxito.

La Federación no clasifica suelos, los estudia en una forma general, teniendo en cuenta las relaciones roca-suelo-clima-planta-hombre, y los agrupa en unidades de vocación de uso o de capacidad de explotación.

Se entiende por unidad de vocación de uso o de capacidad de explotación de suelos, el grupo de éstos desarrollados a partir de un mismo material de origen, caracterizados por el perfil más frecuente y con características físicas, químicas y mecánicas semejantes, al igual que su susceptibilidad a la erosión. Los suelos que conformen la unidad

están localizados en áreas con condiciones parecidas de clima y topografía lo que permite un uso y manejo similares.

La agrupación de los suelos en unidades, permite realizar programas de desarrollo y tecnificación integrados y definidos a nivel regional.

En la tabla 1 se resumen las características de varias unidades de suelos de la zona cafetera colombiana que orientan sobre el uso en café y plátano hartón o dominico.

Las variedades de plátano, dominico, hartón o dominico hartón son indicadoras de condiciones físicas muy buenas del suelo para los cultivos propios de la región cafetera, ya que estas variedades son muy exigentes en estas condiciones.

En la tabla 2, se presentan las principales limitaciones de estas unidades para el cultivo del café al sol. En algunos casos, estas limitaciones se pueden modificar por medio de prácticas culturales y de conservación de suelos y para ello, se dan en esta tabla las respectivas recomendaciones.

* Jefe de la Sección de Conservación de Suelos del Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, Chinchiná, Caldas, Colombia.

TABLA 1.: CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS DE VARIAS UNIDADES IMPORTANTES DE LA ZONA CAFETERA.

Unidad de suelo	Material de origen	pH	Textura	Profundidad efectiva	Relación aire-agua	Estabilidad	Relieve	Fertilidad	Suelo para café	Suelo para plátano Dominicano y Hartón
CHINCHINA (Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Antioquia, Cundinamarca).	Ceniza Volcánica	4.8 - 5.5	FL - FA	Muy buena	Buena	Muy alta	Ondulado a quebrado	Media a baja	Muy bueno	Muy bueno
FRESNO (Tolima, Oriente de Caldas).	Ceniza Volcánica	5.5 - 5.8	FL - FA	Regular	Buena (1a. capa) Muy alta a muy baja (2a. capa)	Muy alta	Ondulado a quebrado	Media a baja	Muy bueno	Malo
LIBANO (Tolima).	Ceniza Volcánica	4.8 - 5.6	FL - FA	Buena	Buena (1a. capa) Media (2a. capa)	Muy alta	Ondulado	Media a baja	Muy bueno	Regular a bueno
QUINDIO Y MONTE-NEGRO (Quindío).	Ceniza Volcánica	5.5 - 6.2	AF - FA	Muy buena	Media (1a. capa) Alta (2a. capa)	Muy baja	Plano a ondulado	Media a baja (muchos suelos ricos en K)	Bueno	Muy bueno
MALABAR (Risaralda, Caldas).	Ceniza Volcánica	5.8 - 6.4	FL - ArF	Regular a mala	Buena (1a. capa) Muy baja (2a. capa)	Media	Ondulado	Media a baja	Regular a malo	Malo
200* (Valle, Caldas, Risaralda, Cauca).	Basalto	5.8 - 6.2	FAr - Ar con grava	Regular	Buena	Media (1a. capa) Muy baja (2a. capa)	Quebrado	Alta (-N)	Regular a malo Bueno (suelo con grava)	Malo
VERACRUZ *	Gneis Feldespáctico moscovítico	5.8 - 6.2	FAr - Ar con grava	Regular	Buena	Media (1a. capa) Muy baja (2a. capa) Alta (Fase pedregosa)	Quebrado	Alta (-N)	Regular a malo Bueno (suelo con grava)	Malo
60* (Caldas, Valle, Amagá, Antioquia).	Anfibolitas	5.5 - 6.0	FAr - ArF con grava	Regular a baja	Media Alta (Fase pedregosa)	Baja a muy baja	Muy quebrado	Alta (-N)	Bueno	Malo
VILLETA *	Esquisto pizarroso	menor de 4.5 (suelos muy ácidos) 4.5 - 5.5 (suelos ácidos)	FAr - Ar con grava	Regular a mala	Baja Alta (Fase pedregosa)	Muy baja	Muy quebrado	Alta (-N)		Regular a malo (suelos muy ácidos) Regular (suelos ácidos) Muy malo (suelo calcáreo)

Cuando presenta algo de pedregosidad es mayor su productividad pero menor su estabilidad. En estado arcilloso presenta mayor estabilidad pero es menor su productividad (pesados, plásticos, problemas de drenaje). En este caso requiere hacer hoyos grandes (50 x 50 x 50 cm) y con acondicionadores físicos (pulpa, gallinaza), para mejorar sus condiciones físicas y aumentar su productividad. En ocasiones se necesitan drenes tanto en ladera como en áreas planas.

Los suelos con bajas profundidades efectivas o con suelos plásticos y con problemas de drenaje se pueden acondicionar a altos costos picando cada sitio de siembra una profundidad de 20 a 30 cm, adicionando mejoradores físicos y construyendo caballones individuales de 20 a 30 cm de altura con el objeto de aumentar la profundidad efectiva y mejorar las condiciones físicas (aire-agua). Se complementa con algunos drenes.

DOCUMENTACIONES DEL CULTIVO DE CAFFA AL SOL EN DIFERENTES SUELOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE CLIMA.

Unidades de suelo	Material de origen	Factores adversos	Problemas	Consecuencias	Recomendaciones
CHINCHINA (Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Antioquia, Cundinamarca).	Ceniza Volcánica	En pendientes mayores del 70%.	Peligro de erosión.	Erosión laminar, surcos, derrumbes, reptación.	No se recomienda cultivo al sol.
FRESNO (Tolima, Oriente de Caldas).	Ceniza Volcánica	Baja retención de humedad.	Resecamiento en verano.	Afecta producción y calidad del grano. Incidencia de plagas y enfermedades.	Abono orgánico al hoyo. Fertilización oportuna (N principalmente). Controles fitosanitarios. En algunos casos sombrío regulado.
LIBANO (Tolima).		Muy baja estabilidad.	Alta susceptibilidad a la erosión.	Fuerte erosión en pendientes mayores del 20%.	No se recomienda cultivos al sol. Se requieren prácticas culturales intensas de conservación.
QUINDIO Y MONTE-NEGRO (Quindío).	Ceniza Volcánica	pH 6.0 - 6.2 Segunda capa pesada (hardpan)	Baja profundidad efectiva. Mal drenaje. Resecamiento en verano. Deficiencias nutricionales (Fe, Mn, Zn, B, principalmente).	Mal desarrollo y baja producción. Afecta calidad del grano. Incidencia de plagas y enfermedades.	Hoyos grandes y con abonamiento orgánico. Fertilización oportuna. Drenaje. Desviación de aguas. Controles sanitarios. Prácticas culturales de conservación.
MALABAR (Risaralda, Caldas).	Ceniza Volcánica	Mediana estabilidad.	Mediana susceptibilidad a la erosión.	Pérdida de la capa orgánica.	En algunos casos sombrío regulado (cañadas localizadas a menos de 1.300 m.s.n.m.). En muchos casos la mala distribución de las lluvias obliga a riego
200 (Valle, Caldas, Risaralda, Cauca).	Basalto	Suelo arcilloso. En ocasiones fase pedregosa.	Pérdida de la capa orgánica. Limita la profundidad efectiva. Mal drenaje. Resecamiento en verano.	Mal desarrollo y baja producción. Afecta calidad del grano. Incidencia de plagas y enfermedades.	Hoyos grandes y con abono orgánico. Drenaje y desvíos de aguas. Control fitosanitario. En algunos casos sombrío regulado.
VERACRUZ (Tolima).	Gneis Moscovítico Feldespáctico	Mediana a baja estabilidad (fase pedregosa).	Mediana a alta susceptibilidad a la erosión.	Mediana a fuerte erosión.	Prácticas culturales de conservación (coberturas y sombrío).
60 (Caldas, Antioquia, Valle).	Anfibolitas	Suelo pedregoso (cascalo). Profundidad efectiva restringida.	Pérdida de la capa orgánica. Baja retención de humedad. Resecamiento en verano.	Restringe el desarrollo. Afecta producción y calidad del grano. Incidencia de plagas y enfermedades.	No se recomienda cultivo al sol. Se requieren prácticas culturales intensas de conservación.
AMAGÁ (Antioquia).		Muy baja estabilidad. Fuertes pendientes y longitudes largas.	Muy alta susceptibilidad a la erosión.	Fuerte erosión.	No se recomienda el cultivo al sol. Se requieren prácticas culturales intensas de conservación.
VILLETA (Cundinamarca, Tolima, Santander, Boyacá).	Esquistos Pizarrosos	Muy baja estabilidad. Fuertes pendientes y longitudes largas.	Muy susceptibles a la erosión.	Fuerte erosión.	
Zonas extramadamente ácidas.		Al, Mn, muy altos	Problemas nutricionales	Problemas nutricionales	No sirven para café.
Zonas calcáreas.		Ca muy alto.	couplejos.	Clorosis calcárea.	No sirve para café.